

An
Labor Berlin
Molekulardiagnostik
Fax (030) 40 50 26 616

Molekulardiagnostik

Tel. +49 (30) 40 50 26-405
Fax +49 (30) 40 50 26-616
www.laborberlin.com

Ergänzende klinische Angaben zur Leptospiren-PCR Anforderung
Die Untersuchung muss online angefordert werden!

Diesen Schein bitte vollständig ausgefüllt **an (030) 40 50 26 616 faxen**

Datum: Arzt: Unterschrift Tel. für Rückfragen:

Patient (eintragen, falls kein Etikett vorhanden)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

☐ männlich ☐ weiblich ☐ unbekannt

Patient

Untersuchungsmaterial

☐ EDTA-Blut Auftragsnummer:

☐ Urin Auftragsnummer:

Einsender

Nur mit diesen klinischen Informationen erfolgt der Probenversand

Klinische Symptomatik:

- ☐ Grippeähnliche Symptome
☐ Morbus Weil
☐ Meningitis/Meningoenzephalitis
☐ Pulmonale Hämorrhagien mit respiratorischer Insuffizienz

Beginn der Symptome:

*in der ersten Woche nach Symptombeginn EDTA-Blut,
ab der 2. Woche nach Symptombeginn Urin einsenden*

Antibiose (welche/seit wann):

*PCR schon ein Tag nach Beginn der Therapie
nicht mehr erfolgsversprechend – Antikörperdiagnostik anfordern!*

Exposition/ggf. Auslandsaufenthalt (wann/wo):

Hinweise zur Erkrankung, siehe [RKI - RKI-Ratgeber - Leptospirose](https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Leptospirose.html)
https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/RKI-Ratgeber/Ratgeber/Ratgeber_Leptospirose.html